

Annexe 1 - Check-list des symptômes possibles de COVID-19

Avez-vous présenté ce jour ou dans la semaine qui précède :

- au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition soudaine, sans autre cause évidente:
 - toux
 - difficultés respiratoires
 - douleur thoracique (dans la poitrine, le thorax)
 - perte d'odorat sans cause apparente (en l'absence d'un rhume ou d'une rhinite allergique connue)
 - perte de goût sans cause apparente

OU

- au moins deux des symptômes mineurs suivants¹, sans autre cause évidente :
 - fièvre ($t^{\circ} \geq 37,5^{\circ}$, prise en-dessous du bras)
 - douleurs musculaires; (non liées à des courbatures ou à un effort physique)
 - fatigue sans cause apparente
 - rhinite (un encombrement ou un écoulement nasal)
 - maux de gorge
 - maux de tête sans cause apparente
 - perte d'appétit sans cause apparente;
diarrhée aqueuse²

OU

- une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

Si la personne a répondu OUI à 1 des symptômes majeurs ou 2 des symptômes mineurs ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques → elle ne peut pas rentrer dans votre établissement

Vous devrez :

- L'informer des mesures sanitaires du SASPE qui visent à protéger les enfants du COVID-19
- Donner un masque à cette personne si elle n'en porte pas déjà un
- Lui donner les bonnes recommandations qui suivent :

Cette personne devra :

- Quitter l'établissement
- Rentrer à son domicile
- Porter un masque sur le trajet entre le SASPE et son domicile
- Contacter son médecin traitant par téléphone et l'informer de ses symptômes

¹ Chez les enfants, la fièvre seulement sans cause apparente suffit également pour envisager le diagnostic de COVID-19 pendant une épidémie.

² Ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes âgées qui peuvent présenter une infection aiguë de manière atypique.